

Hoja clínica

Nº Historia:	6660107385	Tlfno:	601342426
Nombre:	CLIMENT GARCIA, ANTONIO JOSE		
F. Nacimiento:	18/12/1952	Edad:	73 años
Episodio:	40563148	F.Adm:	03/06/2026 10:14
Cobertura:	ADESLAS		
Poliza:	666000001/036024706/00		
Plan:	ADESLAS ALICANTE		
Servicio:	ALERGOLOGIA (Hoja Clínica)		
Centro:	CM Adeslas Alicante		
Profesional:	ESPINOSA HIDALGO, IRIS		
Nº Colegiado:	030312096		

Anamnesis: (Fecha registro: 03/06/2026 10:19)

Paciente acude para inicio de inmunoterapia CLUSTOID MAX OLEA+GRAMÍNEAS+SALSOLA, se le explica la técnica, efectos adversos relacionada con la misma y los efectos adversos propios de la de la medicación, afirmando entenderlo.

Se administran 0.2 ml del medicamento por vía SC y se observa 30 minutos, en ausencia de reacciones, se administran 0.3 ml por vía SC y se observa durante 30 minutos.

A partir de hoy deberá recibir una dosis de 0.5 ml por vía SC con una frecuencia de cada 4 semanas en su centro de salud, para lo cual deberá pedir cita en el mismo.

La vacuna la llevará de 3 a 5 años. La receta de continuación se la hará su alergólogo. Recuerde que una vez que emitida la receta de mantenimiento, desde que la lleve a la farmacia hasta tener la vacuna puede pasar un período que varía de 2 a 4 semanas, con lo cual debe hacerlo con antelación.

OBSERVACIONES GENERALES:

- Esta vacuna (IT) tiene que estar en la nevera dentro de una bolsa de plástico hermética para mantenerse en buen estado. Para transportarla, llévela siempre en su caja.
- Es importante respetar los periodos entre cada inyección.
- Tras la administración del extracto, permanecerá en el centro, al menos 30 minutos. Es conveniente no realizar ejercicio físico intenso justo después de la administración de la dosis, al menos en las dos horas siguientes.

Debe retratarse la administración del extracto si padece:

- Una crisis de asma.
- Fiebre o una infección respiratoria (catarro con síntomas gripales, como son malestar general, dolor muscular, dolor de articulaciones, tiritonas o escalofríos).
- Hepatitis, mononucleosis, tuberculosis activa u otro proceso infeccioso similar.
- Si ha recibido vacuna con virus atenuados en los 7-10 últimos días.
- Entre las vacunas del Covid y la vacuna de alergia se recomienda un período de no menos de 7 días.

En caso de no poder respetar el tiempo de administración de la vacuna, se puede ampliar el tiempo entre dosis hasta un total de 6 semanas, sin necesidad de ajuste posológico. En caso de pasar más de 6 semanas, deberá pedir cita con su alergólogo de referencia para realizar ajuste de la dosis.